

Weidevogeltelling Bovenkerkerpolder 31 maart en 2 april

01: losse vogel(s)

04: nest-indicerend

02: paartje vogels (man en vrouw) bij elkaar

05: nestlocatie


03: territoriaal gedrag, met name baltsvlucht en vechten

Kievit

Kievit: 286 vogels waarvan 238 (=119 paar) als broedpaar in de polder

Conclusie 1: kieviten deels aanwezig op percelen met legselbeheer zoals maisland

Conclusie 2: groot deel kieviten zit nu te broeden, eerste kuikens over twee weken



Groep van 30 kieviten foeragerend op grasland: moeten zich nog verspreiden?

Grutto

Grutto: 308 vogels waarvan 196 (=98 paar) als broedpaar in de polder

Conclusie 1: grutto's geconcentreerd op percelen verhoogd slootpeil/late maaidatum

Conclusie 2: grutto's nu aan begin legseizoen, eerste nesten waarschijnlijk net aanwezig



Groep van 70 grutto's rustend op de plas: moeten zich nog verspreiden?

Groep van 30 grutto's foeragerend op het land: moeten zich nog verspreiden?

Tureluur

Tureluur: 92 vogels waarvan 90 (= 45 paar) als broedpaar in de polder

Ondertelling mogelijk doordat vogels vaak in slootkanten staan en dan gemakkelijk over het hoofd worden gezien

Conclusie 1: tureluurs nu nog deels op percelen verhoogd slootpeil/late maaidatum

Conclusie 2: meeste vogels nog geen territorium, eerste nesten wel binnen een week



Scholekster

Scholekster: 132 vogels waarvan 130 (= 65 paar) als broedpaar in de polder

Conclusie 1: scholeksters verspreid over de polder, 50% buiten verlate maaidatum

Conclusie 2: meeste scholeksters beginnen pas over enkele weken met nest

